

UMBULALI NTSHULUBE

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS: S0

UMBULALI NTSHULUBE, 937,50 mg per 5 ml elixir

Piperazine citrate

Contains sugar: Sucrose 2208 mg

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.

UMBULALI NTSHULUBE is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use UMBULALI NTSHULUBE carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share UMBULALI NTSHULUBE with any other person.
- Ask your health care provider or pharmacist if you need more information or advice.
- You must see a doctor if symptoms worsen or do not improve after a few days.

What is in this leaflet

1. What UMBULALI NTSHULUBE is and what it is used for
2. What you need to know before you take UMBULALI NTSHULUBE
3. How to take UMBULALI NTSHULUBE
4. Possible side effects
5. How to store UMBULALI NTSHULUBE
6. Contents of the pack and other information

1. What UMBULALI NTSHULUBE is and what it is used for

UMBULALI NTSHULUBE is used to treat worm infestations.

It is used for the elimination (removal) of roundworm and threadworm.

2. What you need to know before you take UMBULALI NTSHULUBE

Do not take UMBULALI NTSHULUBE:

- If you are hypersensitive (allergic) to piperazine citrate or any of the ingredients of UMBULALI NTSHULUBE (listed in section 6).
- If you have epilepsy.
- If you have serious kidney damage.

Warnings and precautions

Take special care with UMBULALI NTSHULUBE:

- If you are allergic to tartrazine or aspirin as allergic type reactions may occur including asthma.
- If you have nervous system disorders
- If you have kidney problems
- If you have impaired liver function

If your health worsens while taking UMBULALI NTSHULUBE, see a doctor or pharmacist.

Children

- Children under one year of age can only take UMBULALI NTSHULUBE if told to do so by a doctor.

Other medicines and UMBULALI NTSHULUBE

Always tell your healthcare provider if you are administering any other medicine.

(This includes complementary or traditional medicines).

- Do not take UMBULALI NTSHULUBE with other de-worming medicines.
- UMBULALI NTSHULUBE may increase the adverse effects of phenothiazines such as chlorpromazine.

Pregnancy and Breastfeeding:

If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, please consult your doctor, pharmacist or other health care provider for advice before taking this medicine.

Pregnancy:

If you are pregnant do not use UMBULALI NTSHULUBE unless your doctor has told you to do so.

Breastfeeding:

If you are breastfeeding, take a dose of UMBULALI NTSHULUBE immediately after breast feeding, then do not breast feed for the next 8 hours. Express and discard the breast milk during this time.

Driving and using machines

UMBULALI NTSHULUBE may cause drowsiness, dizziness and blurred vision. Do not drive or use machinery until you know how UMBULALI NTSHULUBE affects you.

UMBULALI NTSHULUBE contains Brilliant Blue (C.I. 42090), ethanol, glycerol, peppermint oil, purified water, sucrose and tartrazine.

- If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking UMBULALI NTSHULUBE.
- UMBULALI NTSHULUBE contains sucrose which may have an effect on the control of your blood sugar if you have diabetes mellitus.

3. How to take UMBULALI NTSHULUBE

Do not share medicines prescribed for you with any other person.

Always take UMBULALI NTSHULUBE exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or nurse has told you. Check with your doctor, pharmacist or nurse if you are not sure.

For the Elimination of Roundworm.

Adults and children weighing 19,0 kg or more should take a single dose of 30 ml (6 medicine measures) of UMBULALI NTSHULUBE before supper.

For infants and children weighing under 19,0 kg the dose is 20 ml (4 medicine measures) of UMBULALI NTSHULUBE before supper.

In cases of constipation, a saline laxative should be given the following morning.

For the Elimination of Threadworm.

Take UMBULALI NTSHULUBE daily after food for seven days.

Dosage Schedule For The Treatment Of Threadworm:

Age	Weight	Dosage
9 - 24 months	6,5 – 9,5 kg	To be continued for seven days
2 – 4 years	9,5 – 12,5 kg	½ medicine measure daily (2,5 ml)
4 – 7 years	12,5 – 19,0 kg	1 medicine measure daily (5,0 ml)
7 – 13 years	19,0 – 38,0 kg	1½ medicine measures daily (7,5 ml)
13 years to adult	over 38,0 kg	2 medicine measures daily (10,0 ml)
		3 medicine measures daily (15,0 ml)

If necessary the course may be repeated after one week.

It is recommended to check all members of a household and treat all positive cases at the same time to prevent spread of the worms and reinfection.

If you take more UMBULALI NTSHULUBE than you should:

An overdose of UMBULALI NTSHULUBE can cause dizziness, blurred vision or nausea.

In the event of overdose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control centre.

If you forgot to take UMBULALI NTSHULUBE:

Do not double the dose. Skip the missed dose and continue with the next dose as directed.

4. Possible side effects

UMBULALI NTSHULUBE can have side effects.

Not all side effects reported for UMBULALI NTSHULUBE are included in this leaflet.

Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while taking UMBULALI NTSHULUBE, please consult your health care provider for advice.

If any of the following side effects happen, stop taking UMBULALI NTSHULUBE and tell your doctor or go to the casualty department at your nearest hospital:

- shortness of breath, tight chest,
- skin rashes, itchy skin, tingling sensation of the skin,
- seizures, loss of muscle coordination, weakness, twitching, shaking, loss of reflexes, involuntary eye movement,
- symptoms similar to that of inflamed liver (hepatitis), due to infection caused by a virus, such as fever, rash, tiredness, nausea, vomiting, poor appetite, joint pain, and headaches,
- nose bleeds and coughing up blood,

These are all serious side effects and you may need urgent medical attention.

Tell your doctor if you notice any of the following:

- sleepiness, dizziness,
- headaches,
- nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain,
- blurred vision and clouding of the lens in the eye.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

Reporting of side effects

If you get side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. You can also report side effects to SAHPRA via the "6.04 Adverse Drug Reaction Reporting Form", found online under SAHPRA's publications: <https://www.sahpra.org.za/Publications/Index/8>.

By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of UMBULALI NTSHULUBE.

5. How to store UMBULALI NTSHULUBE

- Store at or below 25 °C
- Keep the bottle tightly closed and protect from light.
- Keep bottle in unit carton until prior to use
- Do not use after the expiry date stated on the label.

Store all medicines out of reach of children.

Return all unused medicine to your pharmacist.

Do not dispose of unused medicine in drains or sewerage systems (e.g. toilets)

6. Contents of the pack and other information

What UMBULALI NTSHULUBE contains

- The active substance is piperazine citrate 937,50 mg per 5 ml elixir
- The other ingredients are Brilliant Blue (C.I. 42090), ethanol, glycerol, peppermint oil, purified water, sucrose and tartrazine.

What UMBULALI NTSHULUBE looks like and contents of the pack

UMBULALI NTSHULUBE is an apple-green, thick elixir with a peppermint odour and flavour, supplied in 50 ml clear plastic bottles with a white cap.

Holder of Certificate of Registration

Avid Brands S.A. (Pty) Ltd
Suite 9, Hillcrest Office Park
2 Old Main Road , Hillcrest, 3610

This leaflet was last revised in

14 June 2022

Registration number

H925 (Act 101/1965)

Access to the corresponding Professional Information

<https://www.avidbrands.co.za>

Contact information:

Email: info@avidbrands.com

Telephone: 0860 104 061

UMBULALI NTSHULUBE

PASIËNTINLIGTINGSBLAD

SKEDULERINGSTATUS: S0

UMBULALI NTSHULUBE, 937,50 mg per 5 ml elikser

Pipersien sitraat

Bevat suiker: Sukrose 2 208 mg

Lees die hele blaadjie sorgvuldig deur want dit bevat belangrike inligting vir u.

UMBULALI NTSHULUBE is beskikbaar sonder 'n dokter se voorskryf vir u om 'n geringe siekte te behandel. Nietemin, moet u UMBULALI NTSHULUBE versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te verkry.

- Bewaar hierdie blaadjie. Dit mag nodig wees vir u om dit weer te lees.
- Moenie UMBULALI NTSHULUBE met enige ander persoon deel nie.
- Raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer of apteker indien u meer inligting of advies benodig.
- U moet 'n dokter sien indien u simptome vererger of nie verbeter binne 'n paar dae nie.

Wat is in hierdie blaadjie

1. Wat UMBULALI NTSHULUBE is en waarvoor dit gebruik word
2. Wat u moet weet voordat u UMBULALI NTSHULUBE gebruik
3. Hoe om UMBULALI NTSHULUBE toe te dien
4. Moontlike nuwe effekte
5. Hoe om UMBULALI NTSHULUBE te bewaar
6. Inhoud van die pak en ander inligting

1. **Wat UMBULALI NTSHULUBE is en waarvoor dit gebruik word**

UMBULALI NTSHULUBE word gebruik om wurminfestasies te behandel.

Dit word gebruik vir die eliminasie (verwydering) van rondewurms en draadwurms.

2. **Wat u moet weet voordat u UMBULALI NTSHULUBE neem**

Moenie UMBULALI NTSHULUBE neem:

- Indien u hipersensitief (allergies) is vir pipersien sitraat of vir enige van die bestanddele van UMBULALI NTSHULUBE nie (gelys in afdeling 6).
- Indien u epilepsie het nie.
- Indien u ernstige nierskade het nie.

Waarskuwings en voorsorgmaatreëls

Neem spesiale sorg met UMBULALI NTSHULUBE:

- Indien u allergies is vir tartrasien of aspirien, aangesien allergiese-tipe reaksies, insluitend asma, mag voorkom.
- Indien u senuweestelsel versteurings het.
- Indien u nierprobleme het.
- Indien u ingekorte lewerfunksie het.

Indien u gesondheid agteruitgaan terwyl u UMBULALI NTSHULUBE gebruik, gaan sien 'n dokter of apteker.

Kinders

- Kinders onder eenjarige ouderdom kan slegs UMBULALI NTSHULUBE neem indien dit deur 'n dokter aanbeveel word.

Ander medisyne en UMBULALI NTSHULUBE

Vertel altyd u gesondheidsorgverskaffer indien u enige ander medisyne toedien. (Dit sluit komplementêre of tradisionele medisyne in).

- Moenie UMBULALI NTSHULUBE saam met ander ontwormingsmedisyne gebruik nie.
- UMBULALI NTSHULUBE kan die nuwe effekte van fenotiasiene soos chloorpromasien vererger.

Swangerskap en Borsvoeding:

Indien u swanger is of borsvoed, dink dat u swanger mag wees of beplan om 'n baba te hê, raadpleeg asseblief u dokter, apteker of ander gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne neem.

Swangerskap:

Indien u swanger is, moenie UMBULALI NTSHULUBE gebruik tensy u dokter u aangesê het om dit te neem nie.

Borsvoeding:

Indien u borsvoed, neem 'n dosis van UMBULALI NTSHULUBE onmiddellik na borsvoeding, en moet dan nie borsvoed vir die volgende 8 ure nie. Melk borste uit en gooi die borsmelk gedurende hierdie tyd weg.

Bestuur en gebruik van masjinerie

UMBULALI NTSHULUBE kan lomerigheid, duiseligheid en dowwe visie veroorsaak. Moenie bestuur of masjinerie gebruik totdat u weet hoe UMBULALI NTSHULUBE u affekteer nie.

UMBULALI NTSHULUBE bevat Brilliant Blue (C.I. 42090), etanol, gliserol, peperment olie, gesuiwerde water, suikrose en tartrasien.

- Indien u vertel is deur u dokter dat u 'n intoleransie het vir sommige suikers, kontak u dokter voordat u UMBULALI NTSHULUBE neem.

- UMBULALI NTSHULUBE bevat suikrose, wat 'n effek mag hê op die beheer van u bloedsuiker indien u diabetes mellitus het.

3. **Hoe om UMBULALI NTSHULUBE te neem**

Moenie medisyne wat vir u voorgeskryf is met enige ander persoon deel nie.

Gebruik altyd UMBULALI NTSHULUBE presies volgens hierdie inligtingstuk of volgens u dokter, apteker of verpleegkundige se instruksie. Maak by u dokter, apteker of verpleegkundige seker indien u onseker is.

Vir die Eliminasië van Rondewurms.

Volwassenes en kinders wat 19,0 kg of meer weeg moet 'n enkel dosis van 30 ml (6 medisyne) van UMBULALI NTSHULUBE neem voor aandete.

Vir babas en kinders wat minder as 19,0 kg weeg, is die dosis 20 ml (4 medisyne) van UMBULALI NTSHULUBE voor aandete.

In gevalle van konstipasie, moet 'n soutwater lakseermiddel gegee word die volgende oggend.

Vir die Eliminasië van Draadwurms.

Neem UMBULALI NTSHULUBE daaglik na 'n maaltyd vir sewe dae.

Doseringskediule Vir Die Behandeling Van Draadwurms:

Ouderdom	Gewig	Dosis
9 – 24 maande	6,5 – 9,5 kg	Moet volgehou word vir sewe dae
2 – 4 jaar	9,5 – 12,5 kg	½ medisynemaat daaglik (2,5 ml)
4 – 7 jaar	12,5 – 19,0 kg	1 medisynemaat daaglik (5,0 ml)
7 – 13 jaar	19,0 – 38,0 kg	1½ medisynemaat daaglik (7,5 ml)
13 jaar tot volwassene	bo 38,0 kg	2 medisynemaat daaglik (10,0 ml)
		3 medisynemaat daaglik (15,0 ml)

Indien nodig, kan die kursus herhaal word na een week.

Daar word aanbeveel dat alle lede van 'n huishouding ondersoek moet word en dat alle positiewe gevalle behandel word op dieselfde tyd om die verspreiding van die wurms en herinfestasie te voorkom.

Indien u meer UMBULALI NTSHULUBE neem as wat u moes:

'n Oordosis van UMBULALI NTSHULUBE kan duiseligheid, dowwe visie of naarheid veroorsaak.

In die geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie een van hulle beskikbaar is nie, soek hulp by die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

Indien u vergeet om UMBULALI NTSHULUBE te neem:

Moenie die dosis verdubbel nie. Slaan die dosis wat gemis is oor en gaan voort met die volgende dosis soos aangedui.

4. **Moontlike nuwe effekte**

UMBULALI NTSHULUBE kan nuwe effekte veroorsaak.

Nie alle nuwe effekte wat vir UMBULALI NTSHULUBE aangemeld is, word in hierdie blaadjie ingesluit nie. Indien u algemene gesondheid agteruitgaan of indien u enige ongewenste effekte ervaar terwyl UMBULALI NTSHULUBE gebruik word, raadpleeg asseblief u gesondheidsorgverskaffer vir advies.

Indien enige van die volgende nuwe effekte voorkom, hou op om UMBULALI NTSHULUBE te gebruik en kontak u dokter onmiddellik of gaan na die ongevalle afdeling by u naaste hospitaal:

- kortheid van asem, stywe bors,
- veluitslae, jeukende vel, tintelende sensasie van die vel,
- aanvalle, verlies van spierkoördinasie, swaakteid, rukking, bewing, verlies van refleksie, onwillekeurige oorgeweging,
- simptome wat soortgelyk is aan lewerinfamasie (hepatitis), weens infeksie wat veroorsaak word deur 'n virus soos koors, uitslag, moegheid, naarheid, braking, swak aplyt, gewrigpyn en hoofpyn,
- neusbloeding en ophoes van bloed,
- nie is almal ernstige nuwe effekte en u mag dringende mediese aandag benodig.

Vertel u dokter indien u enige van die volgende opmerk:

- slaperigheid, duiseligheid,
- hoofpyn,
- naarheid, braking, diarree, maagpyn,
- dowwe visie en vertroebeling van die lens in die oog.

Indien u enige nuwe effekte opmerk wat nie in hierdie blaadjie genoem is nie, stel asseblief u dokter of apteker in kennis.

Aanmelding van nuwe effekte

Indien u nuwe effekte ervaar, praat met u dokter, apteker of verpleegster. U kan ook nuwe effekte aanmeld by SAHPRA via die "6.04 Adverse Drug Reaction Reporting Form", wat aarlyn gevind kan word onder SAHPRA se publikasies: <https://www.sahpra.org.za/Publications/Index/8>. Deur nuwe effekte aan te meld, kan u help om meer inligting oor die veiligheid van UMBULALI NTSHULUBE te verskaf.

5. **Hoe om UMBULALI NTSHULUBE te bewaar**

- Bewaar by of benede 25 °C.
- Hou die bottel dig toe en beskerm teen lig.
- Hou die bottel in die buite kassie tot voor gebruik.
- Moenie na die verstryk van die vervaldatum wat op die etiket gedruk is, gebruik nie.

Bewaar alle medisyne buite die bereik van kinders.

Neem alle ongebruikte medisyne terug na u apteker.

Moenie ongebruikte medisyne in dreine of rioolsisteme (bv. toilette) weggooi nie.

6. **Inhoud van die pak en ander inligting**

Wat UMBULALI NTSHULUBE bevat

- Die aktiewe bestanddeel is pipersien sitraat 937,50 mg per 5 ml van elikser.
- Die ander bestanddele is Brilliant Blue (C.I. 42090), etanol, gliserol, peperment olie, gesuiwerde water, suikrose en tartrasien.

Hoe UMBULALI NTSHULUBE lyk en inhoud van die pak

UMBULALI NTSHULUBE is 'n appeltreier, dik elikser met 'n peperment reuk en geur, wat verskaf word in 50 ml helder plastiekbottels met 'n wit dop.

Houer van Registrasiesertifikaat

Avid Brands S.A. (Edms) Bpk

Suite 9, Hillcrest Office Park

2 Old Main Straat, Hillcrest, 3610

Hierdie blaadjie was laas hersien op

14 Junie 2022

Registrasienommer

H925 (Wet 101/1965)

Toegang tot die ooreenstemmende Professionele Inligting

<https://www.avidbrands.co.za>

Kontakinligting:

E-pos: info@avidbrands.com, Telefoon: 0860 104 061